

# „Mit kíván a magyar népbeteg?”

## Aktualitások a háziorvos szemszögéből

Továbbképző tanfolyamok  
családorvosok és szakorvosok részére

Pécs, Kodály Központ – 2014. szeptember 6.

Szombathely, Park Hotel Pelikán – 2014. szeptember 20.

Budapest, Park Inn by Radisson Budapest – 2014. szeptember 27.

Szolnok, Garden Hotel – 2014. október 11.

Debrecen, Kölcsey Központ – 2014. október 18.



**PÉCS**



**SZOMBATHELY**



**BUDAPEST**



**SZOLNOK**



**DEBRECEN**



Naproxen:  
alacsony kardiovaszkuláris  
kockázat az NSAID-ek között<sup>1,2</sup>

**Analgesin 275 mg és Analgesin Forte 550 mg filmtabletta, 275 mg naproxen-nátrium filmtablettaként, ez megfelel 250 mg naproxennek és 550 mg naproxen-nátrium filmtablettaként, ez megfelel 500 mg naproxennek. Jav.: rheumatoid**

|                                                   | Határnap | Bruttó fogyasztási ár (Ft) | Normatív támogatási összeg (Ft) | Tényleges normatív támogatás (Ft) esetén (Ft) | Klasszifikációs kód |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ANALGESIN 275 mg</b><br>filmtabletta 30x       | naproxen | 810                        | 134                             | 676                                           | ✓                   |
| <b>ANALGESIN FORTE 550 mg</b><br>filmtabletta 30x | naproxen | 1 189                      | 297                             | 892                                           | ✓                   |

Az Árak 2014. július 1-től érvényesek. A mindenki árákai kapcsolatos bővebb információt az ÖEP honlapján - [www.oepp.hu](http://www.oepp.hu) - találhat. EF070 7./8./A Analízis 275 mg flintalbeta 30x emelt támogatás összeg: 467 Ft, térítési díj emelt támogatás esetén: 343 Ft, Analízis Form 550 mg flintalbeta 30x emelt támogatás összeg: 832 Ft, térítési díj emelt támogatás esetén: 357 Ft.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez: Krka Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pácsirtamező utca 5./3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.

<sup>1</sup> McGettigan P, Henry D. (2011) Cardiovascular Risk with Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Systematic Review of Population-Based Controlled Observational Studies. *PLoS Med* 8 (9): e1001098.

<sup>2</sup> Fosbol E. I. et al. Circulation. 2010. jú. online közlés alapján; Nem-szteroid gyulladásgátlók alkalmazásával összefüggő szív-érrendszeri kockázat észlelése ezekben

## **Tisztelt Kolléganők és Kolléga Urak!**

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez.

A megfelelő program összeállítása nem kis kihívás, hiszen a háziorvosok, szakorvosok továbbképzéseiben is széles a kínálat, valamint a komplex gondolkodásmód fejlesztését kell, hogy szolgálja a tudományos programunk.

Ennek megfelelően igyekeztünk szakmailag érdekes témákat nivós előadók tolmácsolásában a programba helyezni.

Remélhetőleg igyekezetünk nem vész kárba és a tudományos fórumon elhangzott információk közül számosat tudnak majd a napi munkájukban hasznosítani.

Hasznos időtöltést kívánok!

*Dr. Durst János*  
Igazgatóhelyettes  
KRKA


# TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2014. szeptember 6. — Pécs, Kodály Központ  
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)  
[www.kodalykozpont.hu](http://www.kodalykozpont.hu)

Üléselnök: *Prof. Dr. Tóth Kálmán*  
egyetemi tanár, az MTA doktora  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója



- 09:30 - 10:15**      **A halálos négyes - mit tehetünk ellene?**  
*Dr. Bódis Beáta*, egyetemi adjunktus, Ph.D.  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika
- 10:15 - 11:00**      **Újdonságok az antithrombotikus terápiában**  
*Dr. Komócsi András*, egyetemi docens, az MTA doktora  
PTE KK Szívgyógyászati Klinika
- 11:00 - 11:45**      **Gyomorvédelem és kardioprotekció**  
*Dr. Vincze Áron*, egyetemi docens, Ph.D. med.habil.  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika
- 11:45 - 12:05**      **Kávészünet**
- 12:05 - 12:50**      **RAAS-gátló választás**  
*Prof. Dr. Bajnok László*, egyetemi tanár, Ph.D.  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika
- 12:50 - 13:35**      **Fix dózisú vérnyomáscsökkentő kombinációk**  
*Dr. Habon Tamás*, egyetemi docens, Ph.D. med.habil.  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika
- 13:35**                Ebéd

A tanfolyam akkreditációja a rendezvényt követően történik, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.



# TERVEZETT PROGRAM


Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2014. szeptember 20.  
Szombathely, Park Hotel Pelikán  
(9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 5.)  
[www.hotelpelikan.hu](http://www.hotelpelikan.hu)

Üléselnökök: *Prof. Dr. Tóth Kálmán*  
egyetemi tanár, az MTA doktora  
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója

*Prof. Dr. Nagy Lajos, Ph.D.*  
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója



- |                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10:00 - 10:45</b> | <b>A neuroendokrin támadáspontú terápia jelentősége kardiovaszkularis betegségekben</b><br><i>Dr. Mezősi Emese</i> , egyetemi docens, Ph.D. med.habil<br>PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika |
| <b>10:45 - 11:30</b> | <b>Stabil koszorúér betegség és kardiovaszkuláris prevenció</b><br><i>Prof. Dr. Tóth Kálmán</i> , egyetemi tanár, az MTA doktora<br>PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója           |
| <b>11:30 - 12:15</b> | <b>Acut coronaria syndroma</b><br><i>Prof. Dr. Nagy Lajos, Ph.D.</i><br>Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója                                                                      |
| <b>12:15 - 12:35</b> | <b>Kávészünet</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>12:35 - 13:20</b> | <b>Antiarritmiás terápia</b><br><i>Dr. Tahin Tamás</i> , főorvos<br>Zala Megyei Kórház                                                                                                       |
| <b>13:20 - 14:05</b> | <b>Gyomorvédelem és kardioprotekció</b><br><i>Dr. Vincze Áron</i> , egyetemi docens, Ph.D. med.habil.<br>PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika                                                 |
| <b>14:05</b>         | Ebéd                                                                                                                                                                                         |

A tanfolyam akkreditációja a rendezvényt követően történik, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.



# TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 300 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2014. szeptember 27. Budapest, Park Inn by Radisson  
(1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.)  
[www.parkinn.com/hotel-budapest](http://www.parkinn.com/hotel-budapest)

Üléselnökök: *Prof. Dr. Merkely Béla*, tanszékvezető  
egyetemi tanár, az MTA doktora  
SE Kardiológiai Központ igazgatója

*Prof. Dr. Tulassay Zsolt*, az MTA Doktora,  
SE. II. számú Belgyógyászati Klinika

- |                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09:30 - 10:15</b> | <b>Újdonságok a gasztroenterológiai területén</b><br><i>Prof. Dr. Hersényi László</i> , egyetemi tanár<br>SE AOK II. Belgyógyászati Klinika                                  |
| <b>10:15 - 11:00</b> | <b>Az atherosclerosis korai diagnosztizálása és kezelése</b><br><i>Dr. Kerecsen Gábor</i> , adjunktus<br>Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház                  |
| <b>11:00 - 11:45</b> | <b>A lipidajánlások sűrűjében</b><br><i>Prof. Dr. Karádi István</i> , egyetemi tanár<br>SE ÁOK III. Belgyógyászati Klinika igazgatója                                        |
| <b>11:45 - 12:05</b> | <b>Kávészünet</b>                                                                                                                                                            |
| <b>12:05 - 12:50</b> | <b>Fix dózisú vérnyomáscsökkentő kombinációk</b><br><i>Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor</i> , c. egyetemi tanár, med.habil.<br>Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház |
| <b>12:50 - 13:35</b> | <b>Akut koronária szindróma - ki és mit tegyen?</b><br><i>Dr. Becker Dávid</i> , egyetemi docens<br>SE Kardiológiai Központ igazgatóhelyettese                               |
| <b>13:35 - 13:45</b> | Teszt                                                                                                                                                                        |
| <b>13:45</b>         | Ébéd                                                                                                                                                                         |



A Semmelweis Egyetem a SE-TK/2014.II/00157kódszámú tanfolyamot akkreditálta.

A tanfolyam pontértéke orvosok részére - sikeres tesztírás esetén - 8 pont, s a kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél szabadon választható pontszámként kerülnek jóváírásra (szakma szerinti kötelező jelleggel)

A NEFMI 64/2011. (11.29) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt kreditpontot nem kaphatja meg - tehát mint hallgató - részpontszámot sem kaphat.



# TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!


A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2014. október 11. — Szolnok, Garden Hotel  
(5000 Szolnok, Tiszaleti sétány)  
[www.gardenhotel.hu](http://www.gardenhotel.hu)

Üléselnökök: *Prof. Dr. Édes István*, egyetemi tanár,  
az MTA doktora, DE KK Kardiológiai Intézet igazgatója

*Dr. Herczeg Béla*, osztályvezető főorvos

Jász - Nagykun - Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház



**09:30 - 10:15**

**Mikor válasszunk ACE-gátlót és mikor ARB-t?**

*Dr. Hegedűs Ida*, egyetemi docens, Ph.D.

DE KK Kardiológiai Intézet

**10:15 - 11:00**

**A protonpumpa gátlók és H2 receptor blokkolók helye a klinikai gyakorlatban.**

*Dr. Juhász Márk*, egyetemi adjunktus, Ph.D.

SE AOK II. Belgyógyászati Klinkika

**11:00 - 11:45**

**Paradigmaváltás szükségessége stabil koronária betegségben**

*Dr. Herczeg Béla*, osztályvezető főorvos

Jász - Nagykun - Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház

**11:45 - 12:05**

**Kávészünet**

**12:05 - 12:50**

**Thrombocyta-aggregáció gátlás**

*Dr. Szűk Tibor*, egyetemi adjunktus, Ph.D.

DE KK Kardiológiai Intézet

**12:50 - 13:35**

**Az aranyháromszög**

*Prof. Dr. Ábrahám György*, egyetemi tanár Ph.D.

SZTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója

**13:35**

**Ebéd**

A tanfolyam akkreditációja a rendezvényt követően történik, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.




# TERVEZETT PROGRAM

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadók személyében történő változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen az első 100 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

2014. október 18. — Debrecen, Kölcsey Központ  
(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)  
[www.kolcseykozpont.hu](http://www.kolcseykozpont.hu)

Üléselnök: *Prof. Dr. Édes István*, egyetemi tanár,  
az MTA doktora,  
DE KK Kardiológiai Intézet igazgatója



- 09:30 - 10:15**      **Gyomorvédelem: PPI vagy H2-blokkoló**  
*Prof. Dr. Altorjay István*, egyetemi tanár, az MTA doktora DE KK Belgyógyászati Intézet
- 10:15 - 11:00**      **Mikor válasszunk ACE-gátlót és mikor ARB-t?**  
*Dr. Hegedűs Ida*, egyetemi docens, Ph.D.  
DE KK Kardiológiai Intézet
- 11:00 - 11:45**      **Fix dózisú vérnyomáscsökkentő kombinációk**  
*Dr. Fülöp Tibor*, egyetemi adjunktus, Ph.D.  
DE KK Kardiológiai Intézet
- 11:45 - 12:05**      **Kávészünet**
- 12:05 - 12:50**      **A pitvarfibrilláció gyógyszeres terápiája**  
*Dr. Csanádi Zoltán*, egyetemi docens, Ph.D.  
DE KK Kardiológiai Intézet
- 12:50 - 13:45**      **Kardiovaszkuláris prevenció a nagy kockázatú betegeknél**  
*Prof. Dr. Czuriga István*, c. egyetemi tanár, Ph.D. med.habil  
DE KK Kardiológiai Intézet
- 13:45 - 13:50**      **A hipertónia korszerű kezelése az új ajánlások tükrében** *Prof. Dr. Páll Dénes*, egyetemi tanár, az MTA doktora DE KK Belgyógyászati Intézet
- 13:50**                      Ebéd

A tanfolyam akkreditációja a rendezvényt követően történik, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk.





**Szervezési információ/Technikai információ:**

*Bokker Tamás*, projekt manager

Convention Budapest Kft.

H-1461 Budapest, Pf: 11.

Tel: (061) 299-0184, (061) 299-0185, (061) 299-0186,

Fax. (061) 299-0187

e-mail: [tbokker@convention.hu](mailto:tbokker@convention.hu)

on-line regisztráció: [www.convention.hu](http://www.convention.hu)

## candesartan és hidroklorotiazid tabletta

[illegible][illegible]

| Készítmény megnevezése                         | Reális fogyasztási ár (Ft) | Normatív támogatási összeg (Ft) | Tényleges díj normatív támogatás esetén (Ft) | Közigazgatási kiváltható-e |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Karbis 6 mg tabletta 30x</b>                | 998                        | 334                             | 664                                          | ✓                          |
| <b>Karbis 16 mg tabletta 30x</b>               | 1 348                      | 427                             | 921                                          | ✓                          |
| <b>Karlicombi 16 mg / 12,5 mg tabletta 30x</b> | 1 964                      | 519                             | 1445                                         | ✓                          |

Az árak 2014. július 1-ig érvényesek. A mindenkor aktuális árakkal kapcsolatos bővebb információkat az OEP honlapján - [www.oep.hu](http://www.oep.hu) - találhat.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez: Krio Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pácsi utca 5. /3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.



## Klinikai vizsgálat bizonyítja, hogy a Krka bisoprolol\* terápiásan egyenértékű az originális bisoprolollal. (1)

**Sobhycor 5 mg, 10 mg filmtableta** 5 mg, 10 mg bisoprolol-fumarát filmtabletánként. **Jav.**: Hypertensio kezelése, lüchemia szívbetegség (angina pectoris) kezelése, a stabil, krónikus, csökkent balmkari szelektív funkcionális jór szívelégtelenség kezelése ACE gátlókkal, vízhajtókkal és esetlegesen szívelégtelenséggel kombinációban. **Adagolás és alkalmazás:** Fejlesztés: Az adagot egyenként kell beidézni. A szokásos adag 10 mg naponta egyszer, az ajánlott maximális adag 20 mg naponta. Egyes betegeknél a napi 5 mg-os dózis lehet megfelelő. A vesefunkció végső stadiumú károsodása (kreatinin clearance < 20 ml/perc) vagy súlyos májkárosodás esetén a napi adag nem haladhatja meg a 10 mg bisoprololt. Gyermek: Gyermekek esetében nincs tapasztalat a bisoprolol alkalmazására vonatkozóan, ezért nem javasolt gyermekek számára. **Stabil krónikus szívelégtelenség esetén:** A krónikus szívelégtelenség standard kezelése ACE-gátló (vagy az ACE-gátlóval kapcsolatos tolerálékonyság esetén angiotenzin receptor blokkoló), béta-blokkoló, vízhajtó és szívkészítési készítményekkel adásból áll. A beteg állapota stabil kell, hogy legyen (akut szívelégtelenség nélkül) a bisoprolol kezelés megkezdésekor. A szívelégtelenség tünetei rosszabbodása, hipotensio vagy bradycardia jelentéshet a titrálós dózissal alatt vagy később. A bisoprolol-kezelést fokozatos titrálással kell kezdeni a következő lépésekben: 1.25 mg naponta egyszer 1 héten át. Ha ez jól tolerálható, az adag tovább emelendő: 2.5 mg-ra további 1 héten át. Ha ez jól tolerálható, az adag tovább emelendő: 3.75 mg-ra további 1 héten át. Ha ez jól tolerálható, az adag tovább emelendő: naponta egyszer 5 mg-ra a következő 4 héten át. Ha ez jól tolerálható, az adag tovább emelendő: naponta egyszer 7.5 mg-ra a következő 4 héten át. Ha ez jól tolerálható, az adag tovább emelendő: naponta egyszer 10 mg-ra, fenntartó adagként. Az ajánlott legnagyobb adag 10 mg. Az elektrolit paraméterek (púztusszám, vérnyomás) és a szívelégtelenség rosszabbodását jelező tünetek gondos követését ajánljuk a titrálós dózissal alatt. A tünetek akár már a kezelés első napján is megjelenhetnek. **Gyógyszerközlés:** Nem ajánlott kombináció: Verapamil típusú és kisebb fokban diltatens típusú kalcium-antagonisták a kontraktilitás és az atrióventrikuláris átvezetési negatív befolyásolják. Verapamil intravénás adása béta-blokkoló kezeléssel részesülő betegnél súlyos hipotensiót és pitvar-kamrai blokkot eredményezhet. I. osztályba tartozó antiaritmiás szerek (pl. kinidin, diszopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon): a pitvar-kamrai átvezetési időre gyakorolt hatásuk fokozódhat, és a negatív inotrop hatás felerősödhet. Centrális hatású vérnyomáscsökkentő szerek együttes alkalmazása súlyosbíthatja a szívelégtelenséget azáltal, hogy a centrális szimpatikus tónus csökken a szívfrekvencia és a szívteljesítmény csökken, a vazodilatáció jelentéshet. A hirtelen megvonás, különösen, ha a béta-blokkoló atbathayása előtt következik be, növelheti a „rebound hypertension” kockázatát. **Összefoglaló kombináció:** A dihidropidin típusú kalcium-antagonisták mint pl. nifedipin, felidipin és amlodipin: együttes alkalmazásuk fokozhatja a hipotensio kockázatát, és szívelégtelenségben szenvedő betegeknél nem zárható ki a kamrai pumpafunkció további romlásának a kockázata. II. osztályba tartozó antiaritmiás szerek (pl. amiodaron): a pitvar-kamrai átvezetési időre gyakorolt hatás felerősödhet. Helyileg alkalmazott béta-blokkoló tartalmazó készítmények (pl. glucosma kezeléssel adott szemcseppek): hatásaik összehadhat a bisoprolol szisztémás hatásával. Periazimptomatikus kezelés: megnyitja a pitvar-kamrai átvezetési idő, és így fokozódhat a bradycardia kockázata. Insulin és orális antidiabetikumok: a vércukorszintet csökkentő hatás felerősödése. A béta-adreneg receptorok gátlása előfordulhat a hypoglycaemia tüneteit. Anesthetikumok: a reflex tachycardia csillapodik, és a hipotensio rizikója fokozódik. Digitális glikozidok: a szívfrekvencia csökken, a pitvar-kamrai átvezetési idő megrövidül. Nem szteroid gyulladásgátló készítmények (NSAID-ok): az NSAID-ok csökkenthetik a bisoprolol vérnyomáscsökkentő hatását. Béta-szimptomimetikumok (pl. izoprenalin, dobutamin): bisoprolollal kombinálva mindkét szer hatása csökkenhet. Béta- és alfa-szimptomimetikumok (pl. noradrenalin, adrenalin): bisoprolollal kombinálva az alfa-adrenoreceptor közvetítette vasoconstrictor hatás érvényesülhet, melynek következtében vérnyomás-emelkedés jöhet létre, és a claudicatio intermittens romolhat. Nem szelektív béta-blokkoló alkalmazása esetén az ilyen interakciók megjelenését valószínűsíthetjük. Az egyéb antihypertenzív szerek, illetve más, vérnyomáscsökkentő hatást készítmények (pl. trichlousz antidiopresszansok, barbiturátok, fenotiazinok) együttes alkalmazásakor növekedhet az alacsony vérnyomás kockázata. Együttadásuk megfontolandó. Meflokin: fokozott a bradycardia kockázata. Monomino-oxidáz gátlók (bivve MAO-B gátlók): a béta-blokkoló vérnyomáscsökkentő hatása, de emellett a hipertóniás krízis kockázata is fokozódik. **Termékenység, terhesség és szoptatás:** Terhesség: A bisoprolol olyan farmakológiai hatásokkal rendelkezik, melyek károsan befolyásolhatják a terhességet és/vagy a magzatot/ajzslót. Általában elmondható, hogy a béta-adreneg receptorok blokkoló szerek csökkentik a placentára perfúziót, ami kapcsolódhat a foetus fejlődésben elmaradásával, intrauterin halálal, spontán abortusszal és koraszüléssel. Nemkívánatos hatások (pl. hypoglycaemia, bradycardia) előfordulhatnak a magzatban vagy az újszülöttnél. Ha a béta-adreneg receptor-blokkoló alkalmazása szükséges, bétaszimptomimetikus szert választandó. A bisoprolol terhességben nem javasolt, hacsak nem kivételen indokolt. Ha bisoprolol adása szükséges, az uteroplacentaris véráramlást és a magzat növekedését monitorozni kell. Alternatív terápia alkalmazása megfontolandó, amennyiben bármilyen a terhesség vagy a magzatra - káros hatás jelentkezik. Az újszülött állapotát gondosan monitorozni kell. Rendezést az élet első 3 napján várható hypoglycaemia és bradycardia előfordulása. Szoptatás: Nincs arra vonatkozó adat, hogy a bisoprolol kiválasztódik-e az anyatejbe. Ezért a bisoprolol alkalmazása alatt a szoptatás nem javasolt. **Mellékhatások:** szédülés, fejfájás, bradycardia, a már fennálló szívelégtelenség rosszabbodása, végtagi hidegesség vagy zsibbadás, hipotensio, gastrointestinalis panaszok, mint például émelygés, hányás, hasmenés, székrekedés, fáradtság, kimerültség. Kísérő orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. eng. tul.:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjenska cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. **Áll. érv.:** 2013. december 4.

Döbét információkat olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez: Krka Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pacsartemő utca 5. / 3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.

Szabadítási készítmény. A nem támogatott gyógyszer 2010. január elsejétől szabadításra, az árképzés a nagykereskedői és a gyógyszerértékesítői függ. Az árak 2014. január 1-étől érvényesek. Sobhycor 5 mg filmtableta 30x termelési ár: 722 Ft. Sobhycor 10 mg filmtableta 30x termelési ár: 1050 Ft.

**Irodalom:**  
1. Grigorieva NY, Kuznetsov AN, Koroleva TV. Comparative assessment of clinical efficacy and safety of original bisoprolol and generics in patients with CHF in combination with chronic obstructive pulmonary disease. *Serdce (Circulus)* 2012; 11 (4): 223-61. (Пригориєва Н. Ю., Кузнєцов А. Н., Корольєва Т. В. Сравнительная оценка клинической эффективности и безопасности оригинального препарата бисопролол и его дженериков в комбинации с хроническим обструктивным заболеванием легких. *Сердце* 2012; 11(4): 223-61) <http://medic.osan.ru/publications/magazine/3979/>

\* A Krka bisoprololjának márkanéve országoktól eltérő lehet. A kártyán megjelenített vizsgálatban szereplő márkanév a Niperten®.



Fejlesztés és tudás a kiváló minőségű, hatásos és biztonságos termékekért.

# Valsacor®

valsartan  
80 mg, 160 mg, 320 mg filmtabletta

# Co-Valsacor®

valsartan és hidroklorotiazid  
80mg/12,5mg, 160mg/12,5mg, 160mg/25mg, 320mg/12,5mg és 320mg/25mg filmtabletta



## TÖKELETES ELŐADÁS

Az anyag leadásának dátuma: 2014. július 17. - Hungary, Valsacor, AS, 2014/07

Valsacor 80mg, 160mg, 320mg filmtabletta - 80mg, 160mg, 320mg valsartán. Jav: Hypertonia: Esszenciális hipertónia feln. és hipertónia kezelése 6-18 éves gyer. és serd.-nél: Nemrégiben bekövetkezett MI: 80mg, 160mg Tüneteket okozó szívelégtelenségben vagy tünetmentes balkamrai szisztolés működészavarban szenvedő, klinikailag stabil feln. betegek kezelése, akik nemrégiben (12 óra - 10 nap) szívinfarktusban estek át: Szívelégtelenség 80mg, 160mg Tüneteket okozó szívelégtelenség kezelése feln. betegeknek, amennyiben angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátló nem alkalmazható, vagy ACE-gátlóval kombinálva, amennyiben béta-blokkoló nem alkalmazható. Adagolás: Nemrégiben bekövetkezett MI: Klinikailag stabil betegnek a kezelést már 12 órával a szívinfarktus után el lehet kezdeni. A naponta kétszer 20 mg-os kezdő adag után az adagot fokozatosan kell emelni a naponta kétszer 40 mg, 80 mg, ill. 160 mg-os adagra a következő néhány hét során. A max. céldózis naponta kétszer 160 mg. Ált.-ban a napi 2x80 mg adagot a kezelés megkezdését követően 2 héttel, a max. céldózisra, a napi 2x160 mg adagot 3 hónappal a kezelés megkezdése után javasolt elerni az véve alapul, hogy a beteg mennyire tolerálja a gyógyszert. Tünetekkel járó vérnyomáscsökkenés vagy veseműködési zavar előfordulása esetén felfelé kell venni az adag csökkentését. A valsartán a szívinfarktus utáni egyéb kezeléseket - trombolitikumok, ASA, béta-blokkolók, sztratinok vagy diuretikumok mellett is alkalmazható. Az ACE gátlóval kombináció nem ajánlott. MI utáni állapotban lévő betegek kezelése során mindig meg kell határozni a vesefunkció értékeit is. Szívelégtelenség: Az ajánlott kezdő adaga naponta kétszer 40 mg. Az adag naponta kétszer 80, ill. 160 mg-ig emelhető legálábbis kétéves intervallumokban, a beteg által tolerált legnagyobb dózsig. Az egyidejűleg adott diuretikumok adagjának csökkentése megfontolandó. Klinikai vizsgálatokban napi 320 mg volt a max. adag több részletben elosztva. Együtt adható a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyéb gyógyszerekkel. Az ACE-gátló, béta-blokkoló és valsartán hármas kombinációja nem ajánlott Szívelégtelenségben mindig fel kell mérni a vesefunkció is. Hypertónia: Ajánlott kezdő adag naponta egyszer 80 mg. Az antihipertenzív hatást két héten belül kialakul, max. hatását négy héten belül éri el. Azonkál a betegnek, akiknek a vérnyomása a kinti adagig nem állítható be megfelelően, a napi adag 160 mg-ig, illetve max. 320 mg-ig emelhető. Együtt adható egyéb antihipertenzív készítményekkel. Ezeknél a betegnek diuretikum, mint például HCT hozzáadásával a vérnyomás tovább is csökkenthető. Súlyos májkrórosodásban, biliris cirrhosisban, valamint cholestasisban szenvedő betegnek ellenjavallt. A cholestasisban nem jár enyhe vagy közepesen súlyos májkrórosodásban szenvedő betegnek a valsartán nem haladhatja meg a 80 mg-ot. Gyer. és serd., 6-tól 18 éves korig A kezdő adag 35 kg alatti testtömegű gyermekek esetén naponta egyszer 40 mg, és 35 kg-os vagy annál nagyobb testtömegű esetén naponta egyszer 80 mg. A vesefunkció és a szérum káliumszintet szorosan ellenőrizni kell. A felnőttekhez hasonlóan a súlyos májkrórosodásban, biliris cirrhosisban, valamint cholestasisban szenvedő gyermeknél ellenjavallt. Az enyhe vagy közepesen súlyos májkrórosodásban gyermeknél a dózis nem haladhatja meg a 80 mg-ot. Bevehető ékeztől függetlenül, és vízzel kell bevenni. Ellenjav: Gy. ér., súlyos májkrórosodás, továbbá biliris cirrhosis és cholestasis, terhesség. Mellék.: szédülés,

hypotónia, veseelégtelenség és vesekőrosodás. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). KRKA, d.d., Novo mesto, Szlovénia Valsacor 80mg, 160mg, 320mg - 2013. 09. 04.

Co-Valsacor 80mg/12,5mg, 160mg/12,5mg, 160mg/25mg, 320mg/12,5mg és 320mg/25mg filmtabletta valsartán és HCT hatóanyaggal. Segédanyagként: laktóz tartalmaz. Jav: Esszenciális hipertónia kezelése felnőtteknél. A fix dózisú kombináció olyan betegeknek javallt, akiknek a vérnyomása valsartán vagy HCT monoterápiával nem állítható be megfelelően. Adagolás: Ekeztés közben vagy attól függetlenül a bevezetés, és vízzel kell bevenni. A javasolt adag naponta egy filmtabletta. A max. valsartán/HCT adag: 320mg/25mg. Súlyos vesekőrosodásban szenvedő betegnek ellenjavallt. A dózis nem haladhatja meg a 80 mg-ot cholestasisban nem jár enyhe vagy közepesen súlyos májkrórosodásban. Súlyos májkrórosodás esetén ellenjavallt. Ellenjav: Gy. ér., terhesség. Súlyos májkrórosodás, továbbá biliris cirrhosis és cholestasis. Súlyos vesekeletelenség (kreatinin clearance < 30ml/perc), anuria. Rlefaktér hypokalaemia, hyponatraemia, hypercalcaemia és tünetekkel járó hyperuricaemia. Mellék.: Orthostaticus hypotónia, éhségérzet, enyhe hányinger és hányás, urticaria és egyéb típusú kiütések, impotencia. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). KRKA, d.d., Novo mesto, Szlovénia, 2012. 05. 02.

| Készítmény megnevezése                      | Bruttó<br>hogyaztú ár (Ft) | Nommativ<br>támogatási<br>összeg (Ft) | Térítési díj<br>normatív támogatási<br>esetén (Ft) | Készítmény<br>költsége |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| VALSACOR 80 mg filmtabletta 30x             | 853                        | 435                                   | 418                                                | ✓                      |
| VALSACOR 160 mg filmtabletta 30x            | 1 046                      | 530                                   | 516                                                | ✓                      |
| VALSACOR 320 mg filmtabletta 30x            | 2 741                      | 1 504                                 | 1 237                                              | ✓                      |
| CO-VALSACOR 80 mg/12,5 mg filmtabletta 30x  | 928                        | 487                                   | 441                                                | ✓                      |
| CO-VALSACOR 160 mg/12,5 mg filmtabletta 30x | 1 698                      | 621                                   | 1 077                                              | ✓                      |
| CO-VALSACOR 160 mg/25 mg filmtabletta 30x   | 1 460                      | 713                                   | 747                                                | ✓                      |
| CO-VALSACOR 320 mg/12,5 mg filmtabletta 30x | 2 686                      | 1 381                                 | 1 305                                              | ✓                      |
| CO-VALSACOR 320 mg/25 mg filmtabletta 30x   | 3 945                      | 1 687                                 | 2 258                                              | ✓                      |

Az árak 2014. augusztus 1-jétől érvényesek.

A mindenkor aktuális árakkal kapcsolatos bővebb információkat az OEP honlapon - [www.oep.hu](http://www.oep.hu) - találhat.



Fejlesztés és tudás a kiváló  
minőségű, hatásos és  
biztonságos termékekért.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási  
előírást vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőhöz:  
Krka Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5. /3.  
Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.